

VACUNA COVID-19 JANSSEN

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA

- Usted recibirá las vacunas y kits que incluyen el equipo necesario para administrarlas
- Agujas y jeringuillas para aplicar
 - Equipo de protección personal
 - Pads de alcohol estériles
 - Tarjetas de vacunación

Siempre revise las fechas de expiración y almacenamiento y los registros de temperatura ANTES de aplicar la vacuna.

NO aplique vacunas después de las fechas de expiración y almacenamiento o que hayan estado por fuera del rango adecuado de temperatura

Preparación

Si usted recibe la vacuna congelada, recuerde que debe descongelarla antes de administrarla.

Para descongelarla, póngala en la nevera (2°C – 8°C) por varias horas o déjela a temperatura ambiente (15°C - 25°C) por 2 horas.

NO recongele la vacuna

Esta vacuna no requiere dilución.

Administración

- 1**
- ✓ Antes de manipular la vacuna, lávese las manos
 - ✓ Use siempre equipo de protección personal (PPE) para administrar la vacuna (guantes, mascarilla quirúrgica o N95 y protección ocular)
 - ✓ Cambie el EPP si se contamina. Siempre siga las indicaciones de su institución para uso del PPE

- 2**
- ✓ Escoja la aguja adecuada para la aplicación (22-25, 1-1.5")
 - ✓ Use una **aguja y una jeringuilla nueva y estéril** para cada aplicación
 - ✓ Solo aplique las vacunas en el área designada para ese fin
 - ✓ Asegúrese que tiene la información y documentos correctos del paciente, que hizo screening de contraindicaciones y que el **paciente firmó el consentimiento informado**

- 3**
- ✓ Inspeccione cada dosis de la vacuna antes de aplicarla. La vacuna es transparente a ligeramente amarilla/blanca. Confirme que no hay partículas o descoloración.
 - ✓ Mueva suavemente el frasco por 10 segundos antes de extraer cada dosis. **NO LO AGITE**
 - ✓ Limpie la tapa del frasco con un pad de alcohol estéril
 - ✓ Con la jeringuilla y aguja escogidas para la aplicación, retire **0.5 mL** del frasco
 - ✓ Asegúrese que la jeringuilla no está fría al tacto



- 4**
- ✓ Limpie el área de aplicación (músculo deltoide del brazo) con un pad de alcohol estéril
 - ✓ De ser posible, administre en el brazo no dominante
 - ✓ Explique al paciente el procedimiento que va a realizar
 - ✓ Administre la vacuna como inyección intramuscular
 - ✓ Use la misma aguja para extraer la vacuna del frasco y para aplicarla (cámbiela si se daña o contamina)



- 5**
- ✓ Recuérdele al paciente los posibles efectos secundarios más comunes
 - ✓ Pregunte al paciente cómo se siente y diríjalo al área de observación
 - ✓ Entregue la hoja informativa post-vacunación
 - ✓ Complete la tarjeta de vacunación y entréguela al paciente
 - ✓ Informe claramente al paciente que ya completó la serie de vacunación (1 dosis)

Anote la fecha y hora en la que empieza a usar un frasco

Después de empezar a usar un frasco debe usarse en las siguientes 2 horas (si está a T° ambiente, máximo 25°C) **o 6 horas** (si está refrigerada a 2°- 8°C)

Descarte el frasco abierto luego de 6 h. **NO recongele la vacuna**