

¿PORQUÉ UNA DOSIS DE REFUERZO?

- Las personas de 65 años o más podrían correr mayor riesgo de enfermarse de gravedad debido al COVID-19.
- Dependiendo de la gravedad de sus síntomas, algunos adultos mayores podrían tener que quedarse en el hospital y recibir cuidado intensivo.
- Por los riesgos asociados a la edad, se recomienda que los adultos mayores reciban una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
- Para ser elegible para un refuerzo, deben haber pasado al menos cinco meses desde que recibió sus vacunas iniciales de Pfizer o Moderna. Si su dosis inicial fue de Jansen, deben haber pasado dos meses.



PROGRAMA DE VACUNACIÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN VACUNACIÓN

(787)522-3985

**8am a 5pm
lunes a viernes**

BÚSCANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES



DEPARTAMENTO DE SALUD

No se requiere plan médico o documentos de ciudadanía para vacunarse

LA VACUNA ESTÁ ACCESIBLE PARA TODOS

DEPARTAMENTO DE
SALUD



VACUNA CONTRA EL COVID-19 PARA PERSONAS DE 65 AÑOS EN ADELANTE

¿ REFUERZO O DOSIS ADICIONAL?

vacuna@salud.pr.gov

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UNA DOSIS DE REFUERZO O UNA DOSIS ADICIONAL DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19?

Existe mucha confusión entre lo que es una dosis de refuerzo y lo que es una dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19. Ambas son altamente recomendadas y van dirigidas a poblaciones diferentes.

¿QUÉ ES UN REFUERZO?

La primera dosis de refuerzo se administra 5 meses después de las vacunas iniciales a personas mayores de 65 años, personas inmunocomprometidas de 12 años en adelante y trabajadores del cuidado de la salud y seguridad. Una segunda dosis de refuerzo está altamente recomendada para personas de 50 años o más y personas inmunocomprometidas de 12 años en adelante. Esta segunda dosis de refuerzo se debe administrar cuatro meses después de recibir el primer refuerzo.

¿QUÉ ES UNA DOSIS ADICIONAL Y A QUIÉNES SE RECOMIENDA?

Una dosis adicional está aprobada y altamente recomendada para pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos. Estos pacientes pueden no haber desarrollado protección completa con las vacunas iniciales.

Si usted es paciente inmunocomprometido y completó la serie inicial de dos dosis de la vacuna de la marca Pfizer o Moderna, usted debe recibir:

- una dosis adicional 28 días después
- su primer refuerzo 5 meses después de la dosis adicional.
- un segundo refuerzo cuatro meses después del primer refuerzo.



¿ES EFECTIVA LA VACUNA?

Recibir otra dosis de la vacuna COVID-19 NO SIGNIFICA que la primera serie de vacunas no funcionó.

Los estudios científicos han demostrado que una dosis adicional o una dosis de refuerzo mejora la protección inicial, en especial en personas que padecen condiciones de salud previas o que están más expuestas a adquirir COVID-19 por su trabajo o porque viven en entornos comunitarios de riesgo de contagio.